61288/P

Geo. Rose

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

TUMORE ET FLUXU HÆMOR-RHOIDALI.

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,
GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON
Ampliſſimi SENATUS ACADEMICI conſenſu,
Et nobiliſſimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini ſubjicit

DANIEL COOKE, A.M. et
Soc. Med. Edin. Sod.
HIBERNUS.

Ad diem 12 Junii, hora locoque ſolitis.

EDINBURGI:
Apud BALFOUR, AULD, et SMELLIE,
Academiae Typographos.

M,DCC,LXVII.

316831

VIRO PRÆSTANTISSIMO,

GULIELMO CULLEN,

MEDICINÆ IN ACADEMIA EDINENSI

PROFESSORI CELEBERRIMO,

QUO NEMO HODIE OMNEM ARTIS

APOLLINEÆ PARTEM OBSERVATIONIBUS

MAGIS DITAVIT,

DIFFICULTATES IN EA

FELICIUS APERUIT,

AUT DENIQUE ORDINE LUCIDIORI

RES EJUS DISPOSUIT;

HASCE

STUDIORUM PRIMITIAS CONSECRAT

DANIEL COOKE.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30386810

DISSERTATIO MEDICA

DE

TUMORE ET FLUXU HÆMORRHOIDALI.

DEFINITIO.

VOCABULUM Αἱμορροις interdum a Graecis ad ſanguinis fluxum ex ulla corporis parte denotandum uſitabatur; utplurimum autem apud eos, ſicut et apud hodiernos, tumores intra recti extremitatem, vel circa ani ambitum externum ſitos, dolorem afferentes, et ſaepius ſanguinem ſincerum effundentes, deſignare ſolebat.

SPECIES.

In haemorrhoides externas et internas, propter ſedem diverſam, diſtinguuntur. Hae intra rectum poſitae ſunt: Illae vero

 externum

externum ejus finem occupant. Porro, in caecas et apertas ulterius diducuntur, prout ſanguinem necne emittunt.

MORBI DELINEATIO.

Haemorrhoides impetum faciunt doloribus ſpaſticis circa os ſacrum, lumbos, inguina, et pubem, ſenſu ponderis, ac totius corporis languore ſtipatis. Accedit etiam capitis dolor gravans, et breviter omnia quae menſium eruptionem praegredi ſolent ſymptomata. Haec ilico calore, pruritu, et doloribus circa anum lancinantibus, excipiuntur. Tubercula quaſi intra rectum ſentit aeger, et teneſmo moleſto vexatur. Crebro doloribus colicis cruciantibus, ſaepiuſque recurrentibus, tentatur. Quo magis diſtenduntur tumores, eo ſaevior fit podicis dolor, adeo ut neque ſedere neque cubare poſſit aeger ſine maxima moleſtia. Ingraveſcit ſemper alvo exoneranda. Omnium horum ſymptomatum levamen percipitur inſigne,

inſigne, diſrupto tumore. Hoc autem ſanguinis puri, quæ ſemper comitatur, dejectione facile innoteſcit. Si vero nec rumpatur tumor, nec remediis aptis diſcutiatur, dolor magis fixus et gravior evadit; accedunt calor intenſus, ſitis, anorexia, nauſea, pulſuſque frequens et validus. Aeger haud raro ſtranguria tentatur, aut urinae ſuppreſſione; et aliquando ſingultu etiamque aurium tinnitu et vertigine afficitur. Perſtant ſymptomata febrilia donec accedat tumoris ſuppuratio. Tunc magna ex parte ceſſat dolor, puſque copioſe cum foecibus per anum evacuatur. Tuberculum in ulcus converſum ſaepe fiſtuloſum evadit; nec autem tam profundum nec ſanatu adeo difficile, ac hujus loci fiſtulae, ex aliis cauſis ortae, plerumque reperiuntur. Tumor aliquando nequaquam ſuppurat, ſed indolem adipiſcitur gangraenoſam: Talis exitus excrementis foetidis ac ſanioſis dignoſcitur: ſtipatur quoque pulſu debiliter micante, cito, ac irregulari; et

brevi

brevi plerumque hominem e medio tollit.

Haemorrhoides externae rarius ſanguinem effundunt, et plerumque minus afferunt doloris quam internae. In neutra ſpecie fluxus unquam reperitur perpetuus, quanquam aliquando accidit, majus minuſve cruoris, alvo deponenda, ſemper effluere.

Haemorrhoides interdum, non ſecus ac menſes, regularibus redeunt periodis; rarius autem externae quam internae. Ut plurimum ſemel ſpatio bimeſtri vel trimeſtri ſeſe oſtendunt; interdum autem non niſi ſemel vel bis quottannis recurrunt.

Caecae, impetu ſuo, paroxyſmum febris intermittentis aemulari nonnunquam obſervantur.

Sanguinis una vice evacuati quantitas, diverſis variat hominibus. Interdum vix unciae par eſt; nonnunquam autem libram ſuperare invenitur.

DIAGNOSIS.

DIAGNOSIS.

Pauci dantur morbi, qui non a haemorrhoidibus ſatis facile diſcernuntur; nonnullos tamen, iis maxime conſimiles, animadvertere haud abs re erit.

1mo, Dysenteria. Morbus hicce nunquam non torminibus comitatur. Sanguis, muci minori vel majori quantitate ſemper commiſtus, dejicitur, et nullo cum ſymptomatum levamine. Haemorrhoidibus autem nulla adſunt tormina; ſanguis purus ac ſincerus apparet, fluxuſque adventus doloris ac aliarum moleſtiarum cunctarum ceſſationem ſecum adfert.

2do, Morbus niger. Satis facile dignoſcitur ſanguine, ſine ullo circa anum dolore praegrediente, dejecto, nulliſque tumoribus, vel externe conſpiciendis, vel interne ab ipſo aegroto ſentitis. Sanguis hoc morbo quoque effuſus, colore, quem ſtagnatione acquirit, nigricantiori, ſcaturiginem altiorem agnoſcit.

3tio,

3tio, Ascarides. Pulſatio, dolor lancinans, et praecipue tumores, hic omnino deſunt.

4to, Recti prolapsus, facillime diſcernitur, inteſtino ſtatim in eo poſt alvi redditum decidente.

5to, Fici circa anum. Hi carnaſiori quam haemorrhoides et firmiori pollent compagine. In iis quoque abeſt doloris ſenſus.

CAUSAE PROEGUMENAE.

Haemorrhoides fere nunquam infantibus contingere, raro juventutem infeſtare, et plerumque, non niſi poſt annum trigeſimum ſemet oſtendere; vita autem declinante, praecipue dominari, inter omnes convenit auctores.

Multi, viros magis quam faeminae, fluxui haemorrhoidali obnoxios eſſe, aſſeruerunt. Sexum ſequiorem autem, in hac regione ſaltem, altero longe ſaepius hoc morbo

morbo tentatum eſſe, CULLENO, in praxi verſatiſſimo, certiores facti ſumus.

UT aliae haemorrhagiae, ita quoque fluxus hicce, ſaepius tempore vernali graſſatur, propter majorem fluidorum quantitatem, hieme praecurrente, in corpore congeſtam, excretionibus variis tunc admodum minutis; etiamque propter molem auctiorem hiſce fluidis, calore redeunte, illatam. Eos qui puerili aetate ſanguinis per nares profuſioni, adoleſcentia ſanguinis ſputo, obnoxii fuerunt, ingraveſcente aetate, haemorrhoides crebrius adoriuntur. Denique, laxiori habitu praediti, plethorici, et praeſertim melancholici, qui ſemper plethora pollent venoſa, quibuſque venae abdominales prae caeteris valde diſtenduntur, hoc fluxu ſaepius quam alii moleſtantur.

CAUSÆ PROCATARCTICÆ.

HAE ad tria quae ſequuntur capita ſatis commode referri poſſunt.

PRIMO,

Primo, Quaecunque plethoram inducunt; plethorici enim, uti modo obſervavimus, ad haemorrhoides valde proclives ſunt.

Secundo, Illa quibus ſanguinis ad rectum impetus magnopere augetur.

Tertio, Omnia ſanguinis venoſi ex hoc inteſtino refluxum impedientia.

I. Plethoræ cauſae ſunt,

1mo, Nimia alimentorum ingurgitatio, unde haemorrhoides magis apud divites, lauteque viventes, quam pauperes atque egenos valent.

2do, Exercitationis defectus, quo excretiones variae haud rite geruntur, nec inter ingeſta et excreta ratio conſervatur idonea: hinc multum apud eos, qui vitam agunt ſedentariam, dominatur, de quo agitur, morbus.

3tio, Evacuationum conſuetarum ſuppreſſio; quamobrem, poſt annum aetatis quadrageſimum et quintum, crebrius hoc morbo afficiuntur faeminae: Tunc enim fluere ſponte deſinunt menſes.

4to, Evacuationum factitiarum, ut fonticulorum, exſiccatio; praeſertim ſi humor ex iis copioſe effluere ſolitus fuerit; quanquam quidem obſervandum, quod ſi exquiſita ſit inter continentia et contenta ratio, vel exiguam admodum excretionem ſolitam ſiſtendo, humorum ad aliam partem affluxum elicere poſſumus, praecipue ſi ex quavis cauſa pars iſta tali congeſtioni ſpeciatim obnoxia eſſet.

II. Causæ ſanguinis fluxûs ad rectum copioſioris, hae praecipue habendae ſunt.

1mo, Medicamentorum purgantium uſus frequentior. Cathartica tunicam extorum internam ſtimulant, motum periſtalticum celeriorem reddunt, liquorum in inteſtina effuſorum quantitatem et acrimoniam augent; hinc humores a capite et caeteris corporis partibus ad inteſtina locoſque vicinos derivant, uti liquido conſtat ex iiſdem fluxum in gonorrhoea et fluore albo multum augentibus. Quae cum ita ſint, luculenter patebit purgantium ad haemorrhoides excitandas propenſio. Ca-

thartica quoque, ſicut caetera ſtimulantia, tonum quibus applicantur partium debilitant; hinc recti aliorumque inteſtinorum venae reſolventur, eoque facilius vi alicui diſtendenti cedent. Purgantia hunc morbum facillime inducentia, ea praecipue ſunt, quae dum per inteſtina tranſeunt, haud ſatis aſſimilantur; ſed acrimoniam notabilem adhuc conſervant, eoque rectum haud leviter ſtimulant. Talia vi ſpecifica hujus inteſtini irritandi pollere feruntur.

2do, Dysenteria, ſaepenumero ab auctoribus haemorrhoidibus inferendis culpata, optimo cum jure poſt cathartica recenſenda; iiſdem enim modis effectus ſuos praeſtare videtur, ſcil. humores majori quantitate ad rectum alliciendo, eoſdem acriores reddendo, et denique vaſorum inteſtinalium laxationem poſt ſe relinquendo.

3tio, Vina nonnulla, e. g. rubrum Gallicum (Anglice *Claret*) et Tockavienſe, ſaepenumero hunc morbum intulerunt. Haec, praeter indolem ſtimulantem, vi quadam

quadam peculiari frui videntur, quum, iiſdem hominibus, ſimiles effectus uſum vinorum longe fortiorum minime ſequuntur.

4to, Nimis frequens hirudinum ad anum applicatio, quo ſanguis huic loco determinari conſueſcit.

5to, Morbi nonnulli quos haemorrhagiae criticae tollere ſolent, ſaepius fluxu haemorrhoidali terminantur, ſi aeger huic caeteroquin obnoxius fuerit.

6to, Hæmorrhoides poſt graviores irae paroxyſmos acceſſiſſe obſervatae ſunt. Pathema hocce ſanguinis circuitum plurimum accelerat, ſpaſmum quoque per totam corporis ſuperficiem crebro inducit, eoque ſanguinem majori quantitate ad interiora, et, inter caetera, ad rectum, impellit: Modo etiam peculiari hepar afficere, hujuſque viſceris ſecretionem multum augere videtur, uti ex vomitionibus bilioſis, quibus iracundia ſaepiſſime comitatur, liquido conſtat. Hinc haemorrhoides inducere poteſt, diſtenſionem et plethoram topicam portarum venae, vena-

rumque

rumque haemorrhoidalium, quae cum aliis in ea terminant, efficiendo.

III. Ea jam, quae ſanguinis a recto inteſtino refluxum impediendo, haemorrhoides gignunt, enumerare aggrediendum eſt. Obſervare autem liceat, ſanguinem ex hac parte redeuntem ſpeciatim ſtagnationi obnoxium eſſe, uti, ſpectatis ſtructura, uſu, ſituque ejus, plane patebit. Venae enim ejus, non ut in aliis locis, valvulis gaudent; omnis igitur harum preſſio ſanguinem peraeque retropellere ac propellere reperietur. Nullum auxilium ſanguinis tranſitui, vicinorum muſculorum actione, praebetur. Sanguis in hiſce venis, contra ſuam gravitatem, poſitionibus corporis uſitatioribus, aſcendere cogitur. Partes rectum circumambientes multum ſolito laxiores ſunt, adipeque molli tantummodo implentur, quo venae illius facilius vi alicui diſtendenti cedent. Denique, praecipuae venae haemorrhoidales, cum aliis meſeraicis, vena portarum coeunt; quum autem inſignem eſſe hujus

hujus coarctationem, quando hepar introit, omnino neceſſe ſit; alia datur ſanguinis in hiſce venis ſtagnationis cauſa.

Hae ſanguinis in venis haemorrhoidalibus ſtagnationis cauſae ſunt praecipuae.

1mo, Quandocunque augetur mole, vel ſcirrhoſum evadit hepar.

2do, Intestinorum, foecibus vel aëre incluſis, inſolita diſtenſio.

3tio, Graviditas propter auctiorem, quam hoc ſtatu acquirit uterus, molem.

4to, Quanquam per totum tempus, quo gravida eſſet, haemorrhoides vitaverit foemina, partu ipſo ſaepe impetum earum patitur. Tunc enim uterum, partes vicinas, et praecipue rectum, prementem, diaphragmatis et muſculorum abdominalium nixus, multum adjuvant; partus igitur tardus inter cauſas haemorrhoidum potentiſſimas habendus eſt.

5to, Nisus ad alvum deponendam violentiores, eodem quo cauſa jam dicta modo, haemorrhoides excitant. Alvus aſtricta, quae ſaepiſſime haemorrhoidibus inducendis culpatur, effectus ſuos prae-

ſtare

ſtare videtur, et inteſtina diſtendendo, et niſus fortiores producendo; foeces quoque induratae rectum contundent et dilacerabunt.

6to, Aqua in aſcite, rectum, aut caetera in abdomine contenta, comprimendo, hunc morbum facile efficiet.

7mo, Varii circa veſicae collum et vaginam affectus, calculi, v. g. ſcirrhi, et apoſtemata. Quum rectum immediate poſt haſce partes jaceat, patet eas, non niſi hujus inteſtini venas comprimendo, mole augeri poſſe.

8vo, Moeror gravis, diuque fotus, fluxum haemorrhoidalem haud raro induxit. Torporem omnibus abdominis viſceribus, ſed praeſertim jecinori, cui obſtructionem crebro infert, efficiendo, operari videtur: Quomodo hepatis obſtructio haemorrhoides gignat, ſupra narratur.

CAUSA PROXIMA.

Sententia vulgaris venarum haemorrhoidalium diſtenſionem varicoſam ſtatuit

tuit eſſe haemorrhoidum caecarum cauſam proximam; harumque rupturam, haemorrhoides apertas efficere. Ita quidem nonnunquam ſeſe res habet; et accuratiſſimus MORGAGNIUS diſſectionibus monſtravit, venas haſce, quanquam admodum exiguas, in molem enormem aliquando dilatari. Ex tumoris autem inciſi ſpecie cellulari, et venarum inſigni exilitate, in genere concludere licet, tubercula ex ſanguinis effuſionibus in telam adipoſam plerumque oriri. Hoc, dolore qui ſemper adeſt acuto, probabilius redditur; quum venae ſenſilitate notabili nequaquam polleant. Sanguis effuſus vel ex arteriis vel venis effluere poteſt; ex his autem ſaepius, quoniam haemorrhoides apud melancholicos et plethora venoſa praeditos praecipue valeant.

SYMPTOMATUM RATIO.

NONNULLA hujus morbi ſymptomata explicatu haud difficilia ſunt; alia autem dantur multo obſcuriora.

PONDERIS

Ponderis ſenſus ac dolor lancinans ex diſtenſione plane oriuntur.

Quando dolor fixior evadit, et accedunt calor, ſitis, pulſuſque frequens; patet jam adeſſe inflammationem, quam ſymptomata illa febrilia nunquam non comitantur.

Dolores colici ex ſtimulo, a recto, membranarum ſuarum communicatione, ad alia inteſtina propagato, originem ducunt.

Tenesmus recti diſtenſioni debetur. Tubercula enim inteſtinum implentia eundem, ac foecum collectio, excitant ſenſum.

Stranguria naſcitur ex veſicae colli cum inteſtino recto vicinitate, vaſorumque harum partium conſortio, quo ex una ad alteram facile tranſit inflammatio.

Liquet cur omnium ſymptomatum levamen tumorum rupturam aut ſuppurationem conſequatur; eo enim tollitur cauſa illorum praecipua, nempe diſtenſio.

Fistulae, tumoribus ſuppuratis ſupervenientes,

pervenientes, aliis leviores ſunt propter inflammationis ſedem minus profundam.

Pulsus frequens, debilis, et irregularis, quo haemorrhoidum gangraena, ut omnis alia, ſtipatur, ab inſigni vis vitalis attenuatione, pendet.

Dolor alvo reddenda ingraveſcit, quia ſcybala dura tumores irritant. Praeterea niſus officio illo fungendo neceſſarius, notabilem inteſtinorum preſſuram gignit, quo ſanguis in venis haemorrhoidalibus copioſius accumulatur.

Internae plus afferunt doloris quam externae, quia ut foecibus laedantur magis objectae ſunt; ſuperficies etiam recti interna, cute externa ſenſilior eſt; et denique loci calor diſtenſioni magis violentae locum praebet.

PROGNOSIS.

Ex multis obſervationibus liquido conſtat, haemorrhoides, quando diu manſerunt, nec nimia quantitate fluentes, nec multa inflammatione concomitatae, mi-

 nime

nime morboſas ſed potius ſalutiferas habendas eſſe. Hominem a multis malis liberum conſervant, et incaute exſiccatae ſaepenumero exitium intulerunt. Vix morbus in tota noſologia reperitur quem aliquo tempore non induxiſſe fertur haemorrhoidum ſuppreſſio. Eorum tamen praecipui capitibus ſequentibus haud incongrue referri poſſunt.

1mo, FEBRES, et illae praeſertim quibus conjunguntur inflammationes topicae, v. g. pleuritis, peripneumonia, ac nephritis; his minime objectos eſſe haemorrhoidarios, dudum obſervavit HIPPOCRATES.

2do, MORBI illi qui a ſanguinis in capite congeſtionibus morbidis oriuntur, coma puta, apoplexiam, et maniam.

3tio, HYDROPS et cachexia.

MORBOS duobus prioribus capitibus contentos, haemorrhoidum ſuppreſſio, plethoram corpori inferendo manifeſto inducit. Cachexia a plethora quoque oriri poteſt, non ſecus ac propter eandem cauſam menſium ſuppreſſionem conſectari ſolet. Quoniam autem, haemorrhoidibus

rhoidibus obſtructis, majorem ſanguinis copiam per venam portarum tranſire neceſſe ſit, cachexia etiamque hydrops ex hepatis obſtructione ortum quoque ducere poteſt.

In genere, igitur, naturae relinquendae ſunt haemorrhoides.

Tres tamen dantur conditiones quibus medici auxilio opus eſt.

1mo, Si aeger huic fluxui non antea obnoxius fuerit.

2do, Quando propter fluxum immodicum aegri vita periclitatur.

3tio, Quando adeſt inflammatio inſignis.

Priori horum caſu, multum certe hallucinaretur, qui aegrum huic fluxui aſſuefieri pateretur; quoniam ſemper magis minuſve moleſtus ſit; quumque tot mala obſtructio ejus, cujus ſemper periculum eſt, ſecum adferat.

Quod ad fluxum nimium, obſervandum eſt, quod, quanquam nulla ſit haemorrhagia quae hacce facilius perfertur, nec in qua minus ſit periculi, aegrum jactura ſanguinis

guinis ſubito mori, quod interdum tamen evenit; nihilominus multa proferantur exempla quibus fluxus copioſi reditus frequentior anſam poſtea praebuit morbis aliis lethiferis. Fluxus immodicus extremorum frigore praenunciatur, etiamque cutis ſpaſmo, dorſi dolore, artuum debilitate, vultûs pallore, et denique pulſu frequenti. Excipitur virium defectu, corporis totius maraſmo, faciei colore pallido, ſubflavo, vel livido; pulſu debili et tremulo, cachexia, crurum et faciei tumoribus oedematoſis, tandemque hydrope generali. Quum tantae fluxui immodico ſuperveniant calamitates, optimo cum jure ſine mora ſiſtendus eſſe videtur.

Postremo, ſi violenta adſit inflammatio, propter ſymptomata febrilia periculoſa, quae ſemper ſecum adfert, eam totis viribus lenire conari oportet.

RATIO MEDENDI.

Medela haemorrhoidum tradendâ, haud improprium fore duxi, hanc in tres

partes

partes diducere. Harum prima de inflammationis, quando adeſt, mitigandae methodo tractabit. Secunda, Rationem haemorrhoidum pro prima vice advenientium occurrendarum abſolvet. Et tertia, denique, de fluxu immodico ſiſtendo diſſeret.

I. QUANDO violenta urget inflammatio, eam ſedare tentandum eſt; primo, ſanguinis impetum ad partem affectam minuendo; ſecundo, medicamentis topicis ei applicatis.

1. SANGUINIS ad rectum impetus refraenatur,

1mo, VENÆSECTIONE. Haec praeſertim neceſſaria eſt, et quidem in ea tota ſalutis ſpes collocatur, ſi plethoricus ſit aeger. Magis convenit ſanguinem ex brachio quam ſaphena emittere; hujus enim apertio ſanguinem ad inferiora derivat, et quidem ad haemorrhoides incaute ſuppreſſas reſtaurandas adhibetur.

2do, CATHARTICIS antiphlogiſticis, v. g. ſalibus neutris, manna, &c. Haec,

parva

parva quantitate adhibita, non ſolum evacuantium officio funguntur, ſed alvi adſtrictionem tollendo, valde utilia reperiuntur: Cavendum tamen ne, nimia quantitate uſurpata, morbum augeant, ſanguinis impetum ſtimulo ſuo potius fortiorem reddendo, quam minuendo.

2. Medicamenta topica quae hic maxime proſunt,

1mo, Emollientia et relaxantia ſunt; qualia inveniuntur enemata ex aqua calida, vel herbarum emollientium decoctis, etiamque ex oleo calido.

2do, Si haemorrhoides externae ſint, hirudines tuberculis applicati, ſanguinem effuſum exſugendo, multum afferunt levaminis. Nonnulli hirudinibus ſcalpellum praeferunt. Hoc autem, propter majus vulnus quod poſt ſe relinquit, minus commodum mihi videtur.

II. Hæmorrhoidibus pro prima vice ſeſe oſtendentibus obviam itur,

1mo, Sanguinis ad anum fluxum minuendo, modis ſupra memoratis.

2do,

2do, CAUSAS hunc morbum producentes vitando, ut poſtea dicetur.

III. QUANDO ſanguis nimis copioſe evacuatur, fluxus reprimendus eſt,

1mo, SANGUINEM a parte affecta derivando.

2do, VASA laxata aſtringendo.

PRÆTER venaeſectionis et catharticorum uſum, hic praecipue praeſtat humores ad corporis ſuperficiem derivare veſtitu calido, ſtrigilis uſu frequentiori, et equitationis, ambulationis, vel navigationis exercitatione quotidiana. In hunc finem quoque vomitoria haud incongrue tentarentur; quum iiſdem haemoptiſi et haemorrhagiis uterinis cohibendis feliciter uſus ſit ROBISONUS praeclarus.

QUO conſtringantur vaſa ſoluta, adhibenda ſunt aſtringentia. Haec vel interne vel externe uſurpantur. Interna, quum alvum tardam reddere ſolent, externis cedere mihi videntur. Illorum alumen caetera antecellit. Chalybeata hic nocent, ſanguinis

ſanguinis circuitum haud leviter accelerando.

Astringentia externa efficaciſſima ſunt unguentum ſaturninum, decoctum corticis Peruviani, et praecipue decoctum corticis quercini.

Peracta jam haemorrhoidum ſanatione, pauca de cauſis earum vitandis dicere reſtat.

Duæ harum ſunt a quibus praecipue cavendum, plethora, ſcil. et alvi conſtipatio.

Illi occurritur dietâ parcâ et exercitatione multa quotidiana.

Hæc parvis catharticorum lenium doſibus impeditur; in hunc finem eximius Cullenus electario, quod ſequitur, eleganti utitur.

℞ Florum ſulphur. lot. unc. i.
Sal. polychreſt.
Electar. lenitiv. P. L. aa. unc. ſem.
Syr. roſar. ſolut. q. ſ. ut fiat electarium, cujus cap. molem nucis moſchat. M. et V.

FINIS.